

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however , we are not able to contact all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com to settle the situation.


All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



Dr .BABA


OS PARIÉTAL





Os pariétal

- c'est un os pair , uni à celui du coté opposé sur la ligne médiane
- il participe a la constitution de la voute crânienne avec le frontal en avant et l'occipital en arrière
- Il est de forme quadrilatère et aplati




- Il présente deux faces , quatre bords et quatre angles



- la face exocrânienne:
Présente:


- les bosses pariétales (2)
- les lignes courbes temporales sup(11) et inf (12)
- le trou pariétal





- La face endocrânienne:
Est creusée de sillons vasculaires

- la gouttière du sinus longitudinal sup
- la gouttière du sinus latéral ou sigmoïde





Os pariétal


- les bords s'articulent avec les os voisins :

- ❖ Le bord supérieur ou sagittal (17)

- ❖ Le bord antérieur ou frontal (1)


- ❖ Le bord inférieur ou temporal (15)

- ❖ Le bord postérieur ou occipital (13)







- Les angles s'articulent avec les os voisins
 - ❖ *l'angle antéro-supérieur ou frontal(18)*
 - ❖ *l'angle antéro-inferieur ou sphénoïdal(3)*
 - ❖ *l'angle postéro-supérieur ou occipital(19)*
 - ❖ *l'angle postéro –inferieur ou mastoïdien(14)*





Os temporal





- C'est un os pair , situé entre le sphénoïde en avant et l'occipital en arrière
- Occupe l'étage moyen de la base du crane
- Il est constitué par trois éléments :
 - ✓ l'écaille
 - ✓ le rocher
 - ✓ l'os tympanal

1/ ECAILLE


2/ ROCHER


3/ OSTYMPANAL






Le tympanal vient se plaquer sur la face externe du rocher sous le tegmen, sa partie externe en forme d'anneau constitue les parois du conduit auditif externe osseux






L'écaille du temporal participe à la formation de la voute par sa portion verticale et à celle de la base par sa portion horizontale



La portion verticale est une mince lame osseuse presque circulaire, subdivisée en deux champs:

L'un supérieur, temporal, fait partie de la voûte


L'autre, inférieur basilaire, répond au conduit auditif externe et à la portion temporale de l'articulation temporo-maxillaire



- 1- rocher=pyramide pétreuse
- 2- écaille
- 3- os tympanal
- 4- conduit auditif externe
- 16- canal carotidien


Sa pointe interne est proche de l'émergence intracrânienne de la carotide interne

La base postéro-externe présente le relief de l'apophyse mastoïde



1- rocher=pyramide pétreuse
2- écaïlle
5- apophyse mastoïde
6- apophyse zygomatique


Entre les deux champs supérieur et inférieur se détache l'apophyse zygomatique



it de

ant

dedans.



- ECAILLE ou portion squameuse
- Divisée en deux par la apophyse zygomatique

3. "ECAILLE" (Squamosal) : segment de cercle dont le quadrant ant. inf. est rabattu en dedans.



Ecaille,



Apophyse zygomatique

Constituée de deux racines:

- Racine longitudinale :


- ✓ En arrière et en haut : la crête sus-mastoiïdienne
- ✓ en arrière et en bas : l'épine supraméatique de Henlé
- ✓ Deux tubercules
 - tubercule zygomatique ant
 - tubercule zygomatique post

-racine transverse
constitue le condyle temporal




Condyle temporal

VUE LATÉRALE (EXOCRANIENNE)



Segment vertical


- face exocrânienne insertion du muscle temporal



- Face endocrânienne sillon de l'artère méningée moyenne

Segment horizontal


- Se reunit au rocher en formant le CAE
- correspond au segment articulaire de l'ecaille
 - { condyle temporal
 - { cavité glénoïde divisée en deux par la scissure de Glaser



Cavité glénoïde


VUE INFÉRIEURE, exocrânienne

TEMPORAL



Rocher ou pyramide pétreuse

- Forme d'une pyramide quadrangulaire occupant l'espace entre le sphénoïde et l'occipital




Partie endocrânienne

Deux faces séparée par une crête = gouttière du sinus pétreux sup


✓ face antéro-sup:

- ❖ Eminente arcuata
- ❖ Tegmen tympani
- ❖ Hiatus de Fallope
- ❖ Hiatus accessoire
- ❖ Le canal de la trompe d' Eustache



✓ face post


- ❖ Orifice du CAI (nerf VII, VII bis ,nerf VIII , art auditive)
- ❖ la fosse subarcuata
- ❖ La fossette unguéale
- ❖ La gouttière du sinus lat.




Partie exocrânienne

- apophyse mastoïde située en arrière du CAE(15)
- apophyse styloïde (12)
- Trou stylo-mastoïdien (36)
- La facette jugulaire (26)
- Sur le sommet du rocher orifice int du canal carotidien(32)
- La base du rochet l'orifice du CAE(14)

8 cavité glénoïde
10 scissure de Glaser
14 CAE
12 AP. Styloïde
36 trou stylo-mastoïdien
30 trou carotidien
33 canal de la trompe de Eustache
35 AP. tubaire





L'os tympanal

- C'est une lame osseuse en forme de gouttière qui constitue les parois ant, inf. et post de CAE
- présente deux apophyses vaginale et tubaire

